

TREŚĆ ULOTKI INFORMACYJNEJ

Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax: (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

Przestrzegaj instrukcji stosowania preparatu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

GOLIATH GEL

Trutka owadobójcza w postaci żelu.

Zawartość substancji aktywnej:

Fipronil -

0,5 mg/g

rac-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-4-trifluorometanosulfinylo-1H-pirazolo-3-karbonitryl

NUMER POZWOLENIA

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZAKRES STOSOWANIA

Preparat przeznaczony jest do zwalczania karaczanów: prusaków i karaluchów. Zwalcza skutecznie zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Goliath Gel może być stosowany w mieszkaniach, szpitalach, kuchniach, hotelach, barach, restauracjach, sklepach, fabrykach, kinach, teatrach i innych pomieszczeniach oraz na środkach lokomocji, np. na pokładach samolotów, na statkach, itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Goliath Gel umieszczony jest w plastikowych strzykawkach. Preparat wyciskany jest za pomocą specjalnego dozownika. Po usunięciu ze strzykawki zabezpieczeń, należy umieścić ją w dozowniku. Nacisnąć spust powodując wypływ żelu. Preparat należy umieszczać w miejscach gdzie gromadzą się karaczany (za szafami, pod zlewami, w miejscach przechodzenia rur kanalizacyjnych, w skrzynkach elektrycznych, itp.). Preparat powinien pozostać na powierzchni przez dłuższy czas, dlatego też nie należy umieszczać go w miejscach często zmywanych i sprzątanym. Karaczany giną w kilka godzin po spożyciu Goliath Gel. Preparat należy stosować samodzielnie jako trutkę. W tym czasie nie używać preparatów owadobójczych do opryskiwania powierzchni, ponieważ zastosowanie innych środków może spowodować zniechęcenie karaczanów do spożycia Goliath Gel. Jeżeli to możliwe należy usunąć inne źródła pożywienia.

DZIAŁANIE TRUTKI NA OWADY

Preparat wykazuje efekt kaskadowy. Goliath Gel to trutka pokarmowa. Wydalana jest razem z odchodami oraz znajduje się w ciele padłych karaczanów. Ponieważ inne osobniki zjadają odchody i martwe karaczany, ulegają zatruciu. W ten sposób jeden osobnik może „przenieść” trutkę w inne miejsce, gdzie ulegną zatruciu owady, które bezpośrednio nie spożyły preparatu.

DAWKI PREPARATU

0,03g preparatu=jedna kropla o średnicy 3-4mm

1. Populacja szkodników „mała” lub „średnia”

	Dawka kropla/m ²
Prusaki	1
Karaluchy	2

2. Populacja szkodników „duża”

	Dawka kropla/m ²
Prusaki	2
Karaluchy	3

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie nanosić żelu na miejsca przygotowywania i spożywania żywności, w pobliżu naczyń na żywność.

Wyklądać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Używać wewnątrz pomieszczeń.

Nie spożywać posiłków, napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Unikać kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem.

Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.

Po rozłożeniu preparatu umyć ręce wodą i mydłem.

Opróżnione opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.

UWAGA

**ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO PREPARACIE, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.**

PIERWSZA POMOC I INFORMACJA DLA LEKARZA

Gdy poczujesz się źle zasięgnij porady lekarza.

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody;
skonsultować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów ani nie podawać nic
doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykieta.

Wskazówki dla lekarza:

- Postępowanie: leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji
życiowych)

ATIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE**Pomoc medyczna**

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99
Lublin - (0-prefiks-81) 740 26 76
Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00
Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09
Sosnowiec - (prefiks- 32) 266 11 45
Warszawa - (prefiks-22) 619 08 97
Wrocław - (prefiks-71) 343 30 08

Okres ważności -

Data produkcji

Opakowanie wykonane z polietylenu/polipropylenu – strzykawka z dozownikiem.

Nr serii:

TREŚĆ ETYKIETY

Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 570 99 99, fax: (0-prefiks-22) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl

GOLIATH GEL

Trutka owadobójcza w postaci żelu.

Zawartość substancji aktywnej:

Fipronil -

0,5 mg/g

rac-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-4-trifluorometanosulfinylo-1H-pirazolo-3-karbonitryl

NUMER POZWOLENIA

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

Preparat przeznaczony jest do zwalczania karaczanów: prusaków i karaluchów. Zwalcza skutecznie zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Goliath Gel może być stosowany w mieszkaniach, szpitalach, kuchniach, hotelach, barach, restauracjach, sklepach, fabrykach, kinach, teatrach i innych pomieszczeniach oraz na środkach lokomocji, np. na pokładach samolotów, na statkach, itp.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie nanosić żelu na miejsca przygotowywania i spożywania żywności, w pobliżu naczyń na żywność.

Wyklądać w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.

Używać wewnątrz pomieszczeń.

† Nie spożywać posiłków, napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Unikać kontaktu ust, skóry i oczu z preparatem.

Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.

Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zmyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne. Po rozłożeniu preparatu umyć ręce wodą i mydłem. Opróżnione opakowania po preparacie traktować jako odpady komunalne.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji

Opakowanie wykonane z polietylenu/polipropylenu – strzykawka z dozownikiem.

Nr serii:

Przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną.