

Podmiot odpowiedzialny: ZPUH „BEST PEST” Małgorzata Świątosławska, Jacek Świątosławski Spółka Jawna
ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno; tel: (32) 617 75 71; fax: (32) 615 00 07

KOMAROPREN

Produkt biobójczy - insektycyd przeznaczony do zwalczania komarów na zewnątrz obiektów.
Do profesjonalnego stosowania.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym...

Substancja czynna: etofenproks – 125 g/l

Zawiera: terpeny pomarańczowe (d-limonene), eter polioksyetylenowy syntetycznych alkoholi tłuszczowych



Drażniący



Niebezpieczny dla środowiska

Ryzyko poważnego uszkodzenia oka.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na pszczoły.

Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w wentylowanym i suchym pomieszczeniu.

Unikać miejsc nasłonecznionych. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami oraz paszami dla zwierząt. Zakres temperatury: od +5 do +30°C

Ilość produktu w opakowaniu:

Numer serii:

Data produkcji:

Data ważności:

Zastosowanie:

KOMAROPREN to ciekły koncentrat do rozcieńczania wodą przed użyciem, o działaniu kontaktowym, do zwalczania dorosłych form komarów w higienie sanitarnej. Przeznaczony jest głównie dla profesjonalnych ekip wykonujących zabiegi zwalczania komarów na zewnątrz obiektów np. w ogrodach, parkach, na terenach popowodziowych, metodą oprysku lub zamgławiania, zaopatrzonych w odpowiedni specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną.

Preparat można stosować również sprzętem ogólnie dostępnym (tradycyjne opryskiwacze).

Sposób użycia:

• OPRYSKIWANIE

Stosować ciecz roboczą w stężeniu 1 % (np. 50 ml preparatu rozcieńczyć w 5 l wody, dokładnie wymieszać).

Opryskiwać miejsca zacienione, spokojne, zakamarki i naroża ścian, altany, zarośla w ogrodzie i wokół ogrodzenia posesji (tworząc w ten sposób „barierę insektydową”).

Produkt nanieść równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania.

Nie opryskiwać miejsc z pożytkami dla pszczół i roślinami uprawnymi przeznaczonymi do spożycia lub na pasze.

• ZAMGŁAWIANIE

Sporządzić ciecz roboczą: dokładnie wymieszać 1 l preparatu z 2 l wody i 1 l nośnika. Stosować 4 litry cieczy roboczej/ha.

Zaleca się wykonanie zabiegu metodą „gorącej mgły” z użyciem specjalistycznego sprzętu umożliwiającego wytworzenie kropli o wartości średniej średnicy objętościowej (VMD) od 5 do 25 µm.

Produkt rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do odkomarzania.

Uwaga!

1. Zabieg powinien być wykonany przy spokojnej, bezwietrznej pogodzie, najlepiej wczesnym rankiem lub przed wieczorem, w porach wzmożonej aktywności komarów. Opryskując zarośla przybrzeżne należy zwrócić uwagę, aby nie opryskiwać powierzchni otwartej wody. Preparat najskuteczniej działa w temperaturze do 20°C.
2. Przed zabiegiem powiadomić właścicieli pszczół o zamiarze wykonania zabiegu.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 30-60 minut od zabiegu.

Okres wyłączenia terenu z użytkowania: czas niezbędny do wykonania zabiegu.

W razie ich dużego nasilenia komarów zaleca się wykonanie powtórnego zabiegu (możliwość nalotów z niechronionego sąsiedztwa).

Środki ostrożności:

- Zaleca się aby przed zabiegiem i podczas zwalczania komarów teren był oznakowany i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.
- Podczas oprysku nosić odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.
- Nie jeść, nie pić i nie palić.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Twarz i ręce umyć dokładnie wodą i mydłem.
- Nie zanieczyszczać preparatem zbiorników i ujęć wodnych.

Postępowanie z odpadami i opakowaniem

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Oczyszczone opakowania zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.

Produkt w opakowaniu usuwać jako odpad niebezpieczny. Przekazać do utylizacji w zakładzie posiadającym zezwolenie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Objawy zatrucia:

W razie połknięcia lub przy przedłużonym kontakcie mogą wystąpić: bóle lub zawroty głowy, nudności, wymioty, podrażnienie, zaczerwienienie skóry, odczyny uczuleniowe, katar, objawy astmatyczne.

Pierwsza pomoc:

Skażenie oka: zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody (ryzyko uszkodzenia rogówki). Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Skontaktować się z lekarzem okulistą.

Skażenie skóry: zdjąć natychmiast całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. W razie zaschnięcia warstwy preparatu na skórze - zmyć benzyną apteczną. W przypadku długo utrzymującego się podrażnienia skonsultować się z lekarzem

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Po spożyciu: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą a następnie popić dużą ilością wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę

Informacja dotycząca pierwszej pomocy dla lekarzy

Antidotum - brak. Stosować leczenie objawowe.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 349 28 31, Kraków - (12) 411 99 99, Lublin - (81) 740 89 83, Łódź - (42) 657 99 00, Poznań - (61) 847 69 46, Sosnowiec - (32) 266 11 45, Rzeszów - (17) 866 44 25, Warszawa - (22) 619 66 54, Wrocław - (71) 343 30 08